

A close-up photograph of a person wearing a light blue button-down shirt. The person's right hand is placed flat against their chest, over the heart area. The background is a soft, out-of-focus light blue. The entire image is framed by a dashed blue border.

# What's in Your Pocket?

**Ihr Ratgeber für eine gesunde  
Herz-Aggregattasche**


 **Spectranetics<sup>®</sup>**  
*Always Reaching Farther*

Ihr implantiertes Gerät für die Herz-  
Therapie sorgt dafür, dass Sie in Ruhe  
Ihr Leben genießen können.

Aber es ist wichtig, dass Sie  
auch der Aggregattasche Auf-  
merksamkeit schenken – dem  
Ort, an dem Ihr Gerät implan-  
tiert wurde – um sicherzuge-  
hen, dass diese Stelle gesund  
und infektionsfrei bleibt.

Infektionen sind zwar selten  
und treten nur bei 1% der Implantate<sup>2</sup>  
auf, doch sollten Sie Symptome feststellen,  
wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt.

**Etwa 60% der  
Geräteinfektionen  
bleiben  
undiagnostiziert und  
unbehandelt.<sup>1</sup>**



1. Interne Studie archiviert.

2. Wilkoff, Bruce L., et al., How to treat and identify device infections. Heart Rhythm, Vol. 4, No. 11, 2007, 1467-1470.

## Achten Sie auf Ihre Aggregattasche und die Narbe.

Falls Sie das Aussehen der Stelle rund um das Implantat ungewöhnlich, verändert oder beunruhigend empfinden und sich damit nicht gut fühlen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Nachsorgeklinik.

Auch bei kleinen Anzeichen für eine Infektion Ihrer Aggregattasche ist die Nachsorgeklinik Ihr direkter Ansprechpartner.

Dies können **Symptome** einer Infektion sein:<sup>3</sup>


- Schüttelfrost
- Fieber
- Übelkeit
- Schwitzen

Zu **sichtbaren Anzeichen** einer Infektion zählen:<sup>3</sup>

- Schmerzen
- Schwellung
- Rötung
- Wärme- oder Hitzegefühl
- Blut, Eiter oder anderer Flüssigkeitsaustritt
- Hautgeschwüre
- Erosion des Gerätes durch die Haut

3. Sohail, M.R., et al. (2007). Management and outcome of permanent pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator infections. JACC, 49(18), 1851-1859.

Die Haut rund um Ihre Aggregattasche sollte gesund und genauso wie auf Ihrer anderen Brustseite aussehen:



Zu frühzeitigen Anzeichen einer Infektion zählen Rötung, Schwellung oder Hitzegefühl:



*Sollten Sie eines dieser Symptome erkennen, zögern Sie bitte nicht! Rufen Sie sofort bei Ihrer Nachsorgeklinik an, wenn Sie den Verdacht haben, Ihre Tasche könnte sich entzündet haben.*

Infektionen können stark anschwellen und mit Hautschädigungen oder -geschwüren einhergehen:



Im fortgeschrittenen Stadium der Infektion kann das Implantat herausragen oder ganz aus dem Körper austreten:



*Sollten Sie eines dieser Symptome erkennen, zögern Sie bitte nicht! Rufen Sie sofort bei Ihrer Nachsorgeklinik an, wenn Sie den Verdacht haben, Ihre Tasche könnte sich entzündet haben.*

Erkennen Sie eines der hier  
beschriebenen  
Symptome?

Dann wenden  
Sie sich bitte  
sofort an Ihre  
Nachsorgeklinik!



**Arzt Name:** \_\_\_\_\_

**Telefonnummer:** \_\_\_\_\_

**Anschrift:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Spectranetics Deutschland GmbH  
Schweinfurter Straße 7, 97080 Würzburg  
Tel: +49 931 45 200 80 • Fax: +49 931 45 200 811  
spnc.com